

Datos de la región del cielo en el momento de la observación.....**SQM-L 21.0 IR -18° Temperatura ambiente 16°**
Datos de la noche**Alt sol: -33.3° Alt luna: -11.6°**
Datos del objeto**Alt: 53.7° Az: 148.0°**
Telescopio**Stargate 18"**

M62. Exploración

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ 3 regiones de brillo, con un núcleo puntual | ☐ Estrella HD 153516 y la línea de estrellas que cortan abruptamente la región este | ☐ A grandes aumentos, ¿forma de cangrejo? |
| ☐ Tamaño de las regiones | | |
| ☐ Estrellas HD 153484 y HD 153515 como compañeras a bajo aumento | ☐ Forma desigual en el núcleo | |

Orientación de las imágenes: N a las 6, O a las 9, S a las 12 y E a las 3



Datos de la región del cielo en el momento de la observación.....**SQM-L 21.0 IR -18° Temperatura ambiente 16°**
Datos de la noche**Alt sol: -33.3° Alt luna: -11.6°**
Datos del objeto.....**Alt: 53.7° Az: 148.0°**
Telescopio.....**Stargate 18"**




Nagler 31mm (70x - 1° 10' - 6.6mm)

El campo estelar en el que se encuentra M62 es rico en estrellas, pues a pesar de encontrarse cerca de la cola del escorpión está dentro de la región del núcleo de la Vía Láctea. Llama la atención un par de estrellas brillantes situadas al norte del objeto (a las 6:00 tal y como lo estoy viendo en mi ocular), se tratan de HD 153484 y HD 153515 con magnitudes de 7.48 y 8.04 respectivamente y clase espectral M4III y G0II. Por tanto se trata de dos estrellas de color rojizo-dorado. Respecto al tamaño del objeto, con estos aumentos y este campo aparece de tamaño mediano, centrado dentro del ocular. El núcleo es bastante menor que el resto del halo exterior, diría que en una proporción de 1:5 (es decir el núcleo es como la quinta parte del tamaño del objeto). Su forma es redondeada aunque no perfectamente esférica, con un halo exterior desordenado, mostrando zonas con mayor densidad de estrellas.

Es brillante, no requiere visión lateral ni ningún artefacto para observarlo y concentra su brillo en la región central, sin embargo este aumento de brillo no es

pronunciado sino que es bastante suave y paulatino. Es decir se percibe que en su interior es más brillante que en su halo exterior pero ambas zonas son bastante brillantes y no hay una diferencia muy marcada. Incluso a estos bajos aumentos se resuelven muchas de sus estrellas, sobretudo en el halo exterior. Respecto a sus particularidades, con estos bajos aumentos parece mostrar algo de color, especialmente en el interior del cúmulo que aparece como más dorado/amarillento, frente al gris-plateado que muestra el halo exterior, mucho más extenso.

Datos de la región del cielo en el momento de la observación.....**SQM-L 21.0 IR -18° Temperatura ambiente 16°**
Datos de la noche**Alt sol: -33.3° Alt luna: -11.6°**
Datos del objeto**Alt: 53.7° Az: 148.0°**
Telescopio**Stargate 18"**



Ahora el cúmulo ha ganado un poco más de presencia, con el halo exterior destacando especialmente por la extensión del mismo. Con diferencia al ocular anterior destacaría que ahora veo el núcleo dividido en dos partes, una mucha más concentrada y puntual en el interior, rodeada de otra más extensa y un poco menos brillante. Por establecer algunas proporciones nos encontraríamos un núcleo muy interior y puntual, muy brillante, después un halo interno con una proporción de 1/4 del tamaño total del objeto, menos brillante pero más

brillante que el halo externo. Y la otra 3/4 parte del objeto es mucho más extenso, difuso y con estrellas que se resuelven más sencillamente. No presenta ninguna forma peculiar de brazos, al menos yo no consigo identificarlo, porque su halo externo me parece bastante uniforme y caótico en esa uniformidad.

Nagler 22mm (98x - 50' - 4.7mm)


Datos de la región del cielo en el momento de la observación.....**SQM-L 21.0 IR -18° Temperatura ambiente 16°**
Datos de la noche**Alt sol: -33.3° Alt luna: -11.6°**
Datos del objeto**Alt: 53.7° Az: 148.0°**
Telescopio**Stargate 18"**



Estamos observando Juan Antonio Páez y yo en una noche bastante ventosa y eso dificulta que podamos observar el objeto a nuestro placer pero algunos nuevos detalles se observan. El primero lo ha puesto de manifiesto Juan Antonio Páez, destacando que el objeto no es uniforme en su distribución sino que difiere en su eje este-oeste mostrando una región mucho más rica que la otra. Siendo la región del oeste más rica en estrellas que la región del este.

En mis notas de voz me digo que es totalmente posible porque al sur-este del cúmulo existe una estrella HD 153516, de color anaranjado y magnitud 11.08, que si la tomas como referencia y sigues subiendo hacia el norte (bajando tal y como yo veía el objeto con el sur a las 12, así que pasar del sur, a las 12, al norte, a las 6, para mi era bajar por el ocular) se observa una serie de estrellas de magnitud similar que forma una especie de línea

(sobretudo a partir de las 5 tal y como yo lo veo en mi ocular) y a su este (mi derecha), no se observa nada. Mientras que en la región contraria (al oeste) no existe nada parecido, sino todo lo contrario, el halo externo parece que se extiende paulatinamente sin llegar a ninguna zona que marque claramente su final. Tan abrupto es la diferencia que incluso pareciera que el cúmulo es una especie de 9 con el palo recto. Además con el 14mm he perdido toda imagen de color, y el núcleo me parece muy esférico.



Delos 14mm (154x - 28' - 3mm)

Datos de la región del cielo en el momento de la observación.....**SQM-L 21.0 IR -18° Temperatura ambiente 16°**
Datos de la noche**Alt sol: -33.3° Alt luna: -11.6°**
Datos del objeto.....**Alt: 53.7° Az: 148.0°**
Telescopio.....**Stargate 18"**

Con el 10mm no consigo más detalles pero si que confirmo todo lo observado anteriormente, con especial referencia a esa línea de estrellas que tan bien delimita al cúmulo por su región este. El núcleo me parece mucho más esférico y se resuelven muy bien sus estrellas, sobretodo aquellas que están en el borde del núcleo

(además de todas las que se resuelven en su halo exterior).
Un objeto bastante curioso.



Ethos 10mm (216x - 27' - 2.1mm)

Datos de la región del cielo en el momento de la observación.....	SQM-L 21.0 IR -18°	Temperatura ambiente 16°
Datos de la noche	Alt sol: -33.3°	Alt luna: -11.6°
Datos del objeto.....	Alt: 53.7°	Az: 148.0°
Telescopio	Stargate 18"	



Ethos 8mm (270x - 22' - 1.7mm)

Con el 8mm voy perdiendo el halo exterior del cúmulo, además el viento no nos deja tener una observación tranquila. Con todo creemos ver alguna estructura de brazos en el objeto, de forma que llegamos a imaginar que vemos una especie de cangrejo.

Su forma sería, el cuerpo obviamente, la parte central del cúmulo más brillante. En la región este, dónde una línea corta abruptamente la extensión del halo exterior estarían las patas traseras del cangrejo y las pinzas en la ubicación contraria. El cuerpo (la región central brillante

del cúmulo) no sería uniforme sino que se estrecharía (como un trapecio) hacia las pinzas, es decir hacia el oeste, y algunas estrellas brillantes de esa región serían los ojos del cangrejo saliendo de su cuerpo. Un objeto curioso sin lugar a dudas, sobretodo por su diferencia este-oeste.